

DOSAGES D'AZITHROMYCINE POUR SUSPENSION BUVALE EN POUDRE ET COMPRIMÉS, EN FONCTION DE LA TAILLE ET DE L'ÂGE

Juillet 2018

Nourrissons de moins de 6 mois :
Pommade ophtalmique à la tétracycline



Nourrisson

SBP (Suspension Buvable en Poudre)	
Taille (en cm)	Dosage (en ml)
>138	25 ml
> 130-138	19 ml
> 122-130	16 ml
> 110-122	14 ml
> 98-110	12 ml
> 87-98	10 ml
> 76-87	8 ml
> 65-76	6 ml
> 54-65	4 ml
50-54	2 ml

Enfants de 6 mois ou plus et de moins de 7 ans recevant une SBP (Suspension Buvable en Poudre)*



Enfant

Comprimés

Taille (en cm)

Taille (en cm)	Comprimés
>138	4
120 - 138	2

Enfants de 7 ans ou plus et de moins de 15 ans recevant des comprimés



Adolescent

Âge ≥ 15 ans :
4 comprimés



Adulte

*Remarque : Même si l'enfant a 7 ans ou plus et est assez grand pour recevoir un comprimé, il doit recevoir la suspension buvable en poudre si l'on a la moindre inquiétude sur sa capacité à avaler un comprimé.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU DOSAGE D'AZITHROMYCINE

Juillet 2018

BUT

AUCUN
EFFET
INDÉSIRABLE
GRAVE DUE À
UNE
SUFFOCATION

BUT

MEILLEURE GESTION DES
TRAITEMENTS
ADMINISTRÉS AUX
ENFANTS

DOSAGE PAR GROUPE DE POPULATION POUR LES TDM CONTRE LE TRACHOME

Groupe ciblé par Le TDM	Formulation
Enfants âgés de 0 à 6 mois	Pommade ophtalmique à la tétracycline
Enfants âgés de 6 mois à moins de 7 ans Quiconque mesure moins de 120 cm (quel que soit l'âge) Quiconque a des difficultés à avaler des comprimés ou que la prise de comprimés met mal à l'aise	Suspension buvable en poudre dosée en fonction de la taille
Quiconque mesure plus de 120 cm <u>et</u> est âgé d'au moins 7 ans et a moins de 15 ans	Comprimés dosés en fonction de la taille
Quiconque a 15 ans ou plus	Dose de 4 comprimés

TRAITEMENT DES ENFANTS PAR AZITHROMYCIN

Aucun enfant ne doit être forcé à prendre l'azithromycine.

Les sites de distribution peuvent être intimidants pour des enfants. Si l'enfant ne coopère pas ou est anxieux, le parent ou le tuteur est la personne qui convient pour administrer l'azithromycine à l'enfant en atténuant son anxiété.

Si l'enfant ne coopère pas ou est anxieux, l'administrateur du traitement doit dire au parent d'emmener l'enfant dans un lieu plus tranquille où l'on pourra administrer la dose calmement, sous le regard de l'administrateur du traitement.

Lorsqu'on administre l'azithromycine à un enfant, NE JAMAIS lui boucher le nez, le secouer ou l'obliger à basculer sa tête en arrière pour le forcer à avaler.

Si l'enfant résiste, l'administrateur du traitement doit déclarer que l'enfant a refusé le traitement et passer à la personne suivante.

Même si l'enfant a 7 ans ou plus et est assez grand pour recevoir un comprimé, il doit recevoir la suspension buvable en poudre si l'on a la moindre inquiétude sur sa capacité à avaler un comprimé.